



XIX CONGRESO PERUANO DE REUMATOLOGÍA

13 al 15 de octubre del 2016

Hotel Sol de Oro, Lima - Perú

FORMATO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DEL RESUMEN: 23 de Setiembre del 2016

Datos del Autor:

Apellidos y Nombres: Reátegui Sokolova, Cristina

Institución: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen País/Ciudad: Lima- Perú

Dirección de trabajo: Av. Grau 800 – La Victoria

Teléfono: 969474709 e-mail: cristina.reateguis@gmail.com

Enviar al E-mail: socreuma@yahoo.es

RESERVADO PARA
EL COMITÉ
N.º Resumen

Calificación

Por favor lea cuidadosamente el instructivo de autores, antes de escribir su resumen (límite 300 palabras)

RESPUESTA AL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR EN PACIENTES DE UNA COHORTE DE NEFRITIS LÚPICA.

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Lima - Perú

C. Reátegui-Sokolova, Manuel Ugarte-Gil, Rocío Gamboa-Cárdenas, Francisco Zevallos, Jorge Cucho-Venegas, José Alfaro-Lozano, Mariela Medina, Zoila Rodríguez-Bellido, Cesar Pastor-Asurza, Risto Perich-Campos.

Objetivo: Describir una cohorte de pacientes con nefritis lúpica (NL) demostrada por biopsia, y su seguimiento a largo plazo. Determinar el porcentaje de estos, que logran remisión completa con la terapia de inducción administrada.

Material y Métodos: Se analizó una cohorte retrospectiva de pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) y NL confirmada por biopsia, entre 2007 y 2015. Se analizó la respuesta terapéutica completa a los 24 meses, definida como proteinuria menor a 500 mg/24h y creatinina normal, o incremento máximo de 25% con respecto al basal.

Resultados: La población está constituida por 41 pacientes, 35 fueron mujeres (85.4 %), con una edad promedio de 37.56 años. La creatinina basal fue 1.02 mg/dl, la proteinuria basal fue 2092.56 mg/24h. Del total de la población, 40 pacientes recibieron tratamiento inmunosupresor, 9 fueron tratados con Ciclofosfamida (47.5%), 15 con Micofenolato mofetil (MMF) (37.5%), 1 paciente con Rituximab (2.5%), 2 con Inhibidores de calcineurina (5%), y 1 con terapia combinada de MMF e inhibidores de calcineurina (2.5%). Del total de pacientes, 19 (46.34%) lograron remisión completa a los 24 meses. Las clases histológicas encontradas fueron: IV (46.34 %), III (14.63 %), II (14.63 %) y V

Indique la categoría a que corresponde su trabajo (marcar sólo un cuadro)

- | | | |
|--|---|---|
| 1 <input type="checkbox"/> Reumatología Básica | 6 <input type="checkbox"/> Artritis Reumatoidea | 11 <input type="checkbox"/> Terapia Biológica en Reumatología |
| 2 <input type="checkbox"/> Epidemiología | 7 <input type="checkbox"/> Reumatología Pediátrica | 12 <input type="checkbox"/> Reumatología e Infecciones |
| 3 <input type="checkbox"/> Osteoartrosis | 8 <input checked="" type="checkbox"/> Lupus Eritematoso Sistémico | 13 <input type="checkbox"/> Otras Enf. Difusas del Tejido Conectivo |
| 4 <input type="checkbox"/> Osteoporosis | 9 <input type="checkbox"/> Espondiloartritis | 14 <input type="checkbox"/> Métodos Auxiliares em Reumatología |
| 5 <input type="checkbox"/> Fibromialgia | 10 <input type="checkbox"/> Lumbalgias | |

Deseo presentarlo solo como Póster:

Desea postular su trabajo para el Premio Nacional de Reumatología: Si No

Yo certifico que este material no ha sido publicado o presentado en otro evento nacional o internacional al presente.

Firma: Cristina Reátegui Sokolova

Fecha: 30 setiembre 2016